

Совсем недавно Марина Тарасова, главный врач ГУ РОККВД, рассказала о проблеме России – заболеваниях, передающихся половым путем. О том, как не заразиться подобными инфекциями, а также о современных методах лечения ИППП читайте ниже. К большому сожалению многих врачей, в России инфекции, передающиеся половым путем, являются наиболее частой проблемой. С 2001 года ежегодно в поликлиниках и больницах фиксируются особенно высокие показатели заболеваемости такой инфекцией, как сифилис. Впрочем, за эти десять лет смогло измениться многое. Постоянная работа врачей на предмет профилактики заболеваний, передающихся половым путем, более инновационные и усовершенствованные методы лечения, противоэпидемические мероприятия, которые стали прерогативой Российской дерматовенерологической службы, все же не могли не оказать какого-либо положительного эффекта. Именно поэтому в последние годы врачи все же отмечают снижение показателей заболеваемости. Однако проблема все ещё является актуальной для нашей страны и отнюдь не искоренена в разных регионах России.

То, что существенные изменения в показателях заболеваемости инфекциями, передающимися половым путем, все же имеют место быть, показал прошлый, 2010 год. Впервые за последние несколько лет первое место отводится отнюдь не сифилису, однако не менее серьезному и трудно поддающемуся лечению, заболеванию, название которого – уrogenитальный хламидиоз. Удельный вес этого заболевания в структуре других ИППП составил 32,4%.

Второе «почетное» место отводится уrogenитальному трихомониазу, доля которого составляет более 27%. Количество пациентов, которые обращались за медицинской помощью в результате развития сифилиса, составило 11,3%, а пациентов, заболевших не менее неприятным заболеванием, таким, как гонорея – 7,4%. Помимо этого, было зафиксировано 273 случая заболевания уrogenитальным герпесом, и таким образом, удельный вес этого заболевания в общей структуре заболеваний, передающихся половым путем, составил 8,6%.

Приведенные данные свидетельствует об актуальности несколько других инфекций, передающихся половым путем. Среди них особое значение врачи отводят уrogenитальному хламидиозу, а также трихомониазу. Впрочем, значимость развития сифилиса или гонореи по-прежнему велика, а потому вероятность возникновения именно этих инфекций также нельзя сбрасывать со счетов.

Актуальной проблема развития заболеваний, передающихся половым путем, является ещё и потому, что многие эти инфекции могут в самое кратчайшее время – в результате их не выявления и не лечения – стать основной причиной нарушения репродуктивных функций и у женщин, и у мужчин.